

Centro de Salud:

Dirección

Teléfono:

Hoja Informativa Sobre el DIU, para Llevar a Casa**[] DIU T de Cobre (Paragard®)**

- Comienza a funcionar ahora mismo para prevenir el embarazo.
- Puede permanecer dentro de su cuerpo por 12 años.
- Fecha de remoción _____ (12 años a partir del día de hoy)

[] DIU con Hormonas (Mirena®, Liletta®)

- Comienza a funcionar ahora mismo para prevenir el embarazo.
- Puede permanecer dentro de su cuerpo por 8 años.
- Fecha de remoción _____ (8 años a partir del día de hoy)

El día de **hoy**, usted puede regresar a la escuela o el trabajo después de su cita. **Espera 24 horas después** de que el DIU sea colocado para poder usar tampones, tomar un baño, o tener relaciones sexuales vaginales.

Usted podría tener más **calambres o un sangrado más copioso** con sus menstruaciones, o manchado entre sus menstruaciones. Esto es normal. Los calambres y el sangrado pueden durar por 3-6 meses con los DIUs Mirena®, Liletta®, Kyleena®, y Skyla® (de hormonas). Después de 6 meses, los calambres y el sangrado deberían mejorar. Mucha gente dejará del todo de tener menstruaciones después de 1-2 años con los DIU Mirena®, Liletta®, Kyleena®, y Skyla® (de hormonas). Si usted tiene el DIU Paragard® (de cobre), usted puede tener más calambres y más sangrado con sus menstruaciones mientras tenga el DIU dentro de su cuerpo.

El **Ibuprofeno** (también conocido como Advil® o Motrin®) ayuda a disminuir el sangrado y los calambres. Usted puede comprar el ibuprofeno sin receta en cualquier farmacia. Puede tomar hasta 4 píldoras (800 mg) de Ibuprofeno cada 8 horas con comida (cada píldora contiene 200 mg). Para prevenir los calambres, comience a tomar el Ibuprofeno tan pronto como su menstruación comience y sigue tomándolo cada 8 horas por los primeros 2-3 días de su menstruación. También puede usar una almohadilla caliente en su abdomen si tiene calambres severos.

Su DIU podría ser expulsado espontáneamente en los primeros tres meses. Si usted puede sentir los hilos, el DIU está en el lugar correcto. Si su DIU se sale, se puede quedar embarazada inmediatamente. Si usted no está seguro como chequear los hilos, nosotros le podemos ayudar. (Nuestro número de teléfono está en el encabezado de este papel). Mientras tanto, use condones.

El DIU NO la protege contra las infecciones de transmisión sexual (ITS). **SIEMPRE use protección contra las infecciones de transmisión sexual** (condones externos, condones internos, protectores dentales), si usted está a riesgo. Si usted piensa que ha sido expuesta a una ITS, hable con su proveedor de salud sobre hacerse una prueba. La mayoría de infecciones pueden ser tratadas **SIN** remover su DIU.

SEÑALES DE ALARMA:**En las primeras tres semanas de la colocación del DIU:**

- Fiebre (>101F)
- Escalofríos
- Dolor fuerte o agudo en su estómago o abdomen

En cualquier momento (estas son muy raras):

- Menstruación retrasada (para usuarios del Paragard®)
- Sensación de embarazo (sensibilidad en los pechos, náusea, vómitos)
- Prueba casera de embarazo positiva

Si usted presenta cualquiera de las señales de alarma mencionadas arriba, debería visitar a su clínico habitual. Usted puede llamar a esta clínica al _____, o ver a su clínico habitual.