



Requisitos de Inmunización en Nuevo México para Guarderías/Preescolar/Escuelas

El personal de enfermería escolar de Nuevo México ha recibido autoridad de Salud Pública por parte de la Secretaría de Salud de NM para recolectar y someter información sobre inmunizaciones

2025-26 año escolar

| Vacuna | # Mínimo de dosis por edad | | | | | | | Dosis de vacuna por nivel de grado escolar | | | | | | | | | | | | Notas | | |
|--|----------------------------|---------|-------------|----------|----------|----------|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | 4 meses | 6 meses | 12 meses | 15 meses | 47 meses | 54 meses | ≥ 60 meses | K | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | | 12° | |
| Difteria/Tétanos/Pertussis (DTaP/DT/Td)* | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 (4) | 5 (4) | 5 (4) | 5 (4) | 5 (4) | 5 (4) | 5 (4) | 5 (4) | 5 (4) | 5 (4) | 5 (4) | 5 (4) | 5 (4) | 5 (4) | 5 (4) | Una dosis requerida en/después 4° cumpleaños. Cuatro dosis suficientes, si son dadas en/después del 4° cumpleaños, con al menos 6 meses entre las últimas dos dosis. Se prefieren cinco dosis para una protección óptima. |
| Tétanos/Difteria/Pertussis (Tdap) | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Una dosis de Tdap requerida para entrar al 7°-12° grado. Tdap debería ser dada entre los 11-12 años, pero puede ser dada a los 10. Dosis dadas antes de los 10 no son válidas para entrada al 7° grado. |
| Polio (IPV)* (VOP†) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 (3) | 4 (3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Estudiantes en grados K-12° se les requiere una dosis final en o antes del 4° cumpleaños. Tres dosis suficientes si el refuerzo fue programado por CDC Y la última dosis fue dada en/antes del 4° cumpleaños, con al menos 6 meses entre las dos últimas dosis. |
| Sarampión/Paperas/Rubéola (MMR) | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Mínima edad válida para la primera dosis es 12 meses. Vacunas vivas (MMR, Varicela) tienen que ser dadas el mismo día, si no, tienen que ser administradas con un mínimo de 28 días entre ellas. § |
| Haemophilus Influenzae tipo B (Hib)* | 1 | 2 | 2 | 2 | 3/2/1 | 3/2/1 | 3/2/1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hepatitis B (HepB) | 1 | 2 | 3 ver abajo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | Dos dosis de Recombivax HB, para adultos también son válidas si son administradas entre las edades de 11-15 y si la segunda dosis es recibida no antes de la semana 16, después de la 1° dosis. |
| Neumococo (PCV)* | 2 | 3 | 3 | 4/3/2/1 | 4/3/2/1 | 4/3/2/1 | 4/3/2/1/0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varicela (VAR) | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Mínima edad para la primera dosis es 12 meses. Dosis #2 debe ser administrada a la edad ≥4, vea nota en la pág. 2. Vacunas vivas (MMR, Varicela) tienen que ser dadas el mismo día, si no, tienen que ser administradas con un mínimo de 28 días entre ellas. § |
| Hepatitis A (HepA) | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | Recomendada en los grados 5-12°. Edad mínima para la Hep A es 12 meses. |
| Meningococo Men ACWY | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1° dosis requerida para entrar al 7°-11° grado; 2 dosis requeridas para grado 12 y recomendada a los 16 años. Horario detallado en página 2. |

Vacunas recomendadas: Estas vacunas son recomendadas, pero en este momento no requeridas para comenzar en la escuela

Influenza (flu, gripe): La edad apropiada de vacianción es recomendada cada año.

VPH: Se recomienda la vacuna VPH (vacuna para evitar cancer) a los 11-12 años, y puede ser dada tan pronto como a los 9 años.

COVID-19: Se recomiendan vacunaciones desde los 6 meses hasta los 18 años. Vaya al sitio web COVID-19 del Depto. de Salud de NM para las guías actualizadas: <https://cv.nmhealth.org/covid-vaccine/>

| # de dosis recomendadas para estudiantes 19+ en escuela secundaria | |
|--|---------|
| Vacuna | # Dosis |
| Tétanos/Difteria/Pertussis (Tdap) | 1 |
| Sarampión/Paperas/Rubéola (MMR) | 2 |
| Varicela (VAR) | 2 |

Difteria/Tétanos/Pertussis: Si el niño (4 meses-6 años) está retrasado con sus vacunas, siga la programación de CDC para ponerse al día ([catch-up schedule](#)).

Tétanos/Difteria/Pertussis: Estudiantes en 7°-12° grado, necesitan prueba de 1 dosis de Tdap sin importar cuándo fue dada la última vacuna conteniendo Td.

Para ponerse al día: Niños de 7-18 años quienes no están completamente inmunizados con la serie DTaP deben ser vacunados de acuerdo con el programa para ponerse al día CDC, con Tdap como la primera dosis, seguida por Td, de ser necesaria. Una serie de 3 dosis es suficiente si fue iniciada después de los 7 años, en la que 1 de las dosis tiene que ser Tdap, seguida por 2 dosis de Td. Niños de 7-9 años quienes reciben 1 dosis de Tdap como parte de la serie para ponerse al día, requieren 1 dosis adicional a los 11-12 para entrar al 7° grado.

Polio: Un mínimo de 4 semanas entre las dosis son requeridas con 6 meses entre las últimas dos dosis. **#VOP: Solo VOP trivalente cuenta como válida. VOP monovalente o bivalente no son válidas.** Todas las dosis dadas después del 1 de abril de 2016 se presumen son mono o bivalente.

MMR: Requerida 2da dosis debe ser dada en/después 4° cumpleaños. Sin embargo, la 2da dosis puede ser dada mas antes con al menos 4 semanas entre las dosis 1° y 2°.

Hib: Si se comienza la serie <12 meses de edad, se requieren 3 dosis con al menos 1 dosis en/después del 1er cumpleaños. 2 dosis requeridas si la 1ra dosis es recibida a los 12-14 meses. Una dosis de la vacuna Hib administrada entre las edades 16-59 meses es suficiente. No es recomendada para ≥60 meses.

Hep B: Dosis #2 a un mínimo de 4 semanas después de la dosis 1; dosis 3 al menos 16 semanas después de la dosis 1 y al menos 8 semanas después de la dosis 2. **Para infantes actualmente recibiendo las series primarias, la dosis final debe ser administrada no antes de las 24 semanas.**

PCV: Administre una serie de la vacunas PCV13 en las edades de 2,4,6 meses con un refuerzo a la edad de 12-15 meses. **Para ponerse al día:** Administre una dosis de PCV13 a todos los niños saludables de 12-59 meses quienes no estén totalmente vacunados para su edad; niños >60 meses, no se les requieren dosis.

Varicela: Para niños de 12 meses-12 años, el intervalo mínimo entre las dos dosis es 3 meses. Sin embargo, si la 2° dosis fue administrada ≥28 días después de la 1° dosis, la 2° dosis es considerada válida y no se necesita repetir. Para niños ≥13 años, se recomienda un intervalo mínimo de 4 semanas. **Se requiere prueba de inmunidad contra la varicela:**

- Para grados K-10°: **Comprobante de vacunación; título o diagnóstico confirmado por laboratorio como prueba de enfermedad previa.**
- Para grados 11-12°: Comprobante de vacunación, prueba escrita de inmunidad por un médico/proveedor del cuidado de la salud o título de laboratorio.
- Todos los **casos nuevos** diagnosticados de Varicela **requieren confirmación de la enfermedad por laboratorio.**

Hep A: Una dosis requerida a los 15 meses; 2 dosis requeridas a los 48 meses con al menos 6 meses entre las dosis.

MenACWY:

- **1ra dosis:** Todos los adolescentes deben recibir una dosis a los 11-12 años.
- **2da dosis (refuerzo):** **Recomendada a, o después de los 16 años; requerida para el grado 12. Una dosis de refuerzo antes de los 16 años no es considerada válida.**
 - Adolescentes quienes reciben la 1ra dosis a los 13-15 años, deben recibir el refuerzo a los 16 años.
 - El intervalo mínimo entre las dosis 1ra y 2da es de 8 semanas.
 - Si la 1ra dosis es dada después de los 16 años, no se necesita el refuerzo.
 - **Se puede usar la nueva MenABCWY a los 16 años y cuenta como la 2da dosis de MenACWY.**
 - **MenB no es requisito para la escuela. MenB no es intercambiable con MenACWY.**
 - Las dosis de MenACWY dadas a los 9 años o menores no cuentan como requisitos escolares y tienen que ser repetidas a los 11-12 años y con un refuerzo a los 16.

Período de Gracia de 4-Días: Vacunas administradas ≤4 días antes del intervalo mínimo o edad son válidas; **sin embargo, el período de gracia de 4 días no debe ser aplicado al intervalo de 28 días entre las vacunas vivas parenterales o inyectables no administradas durante la misma visita (MMR, Varicela, y FluMist).**

Recursos

Notas

- Se espera que todos los estudiantes matriculados en los grados designados cumplan con los requisitos.
- **Cambios a los requisitos del año pasado han sido resaltados para facilidad de uso.**

Refiérase al programa de inmunización CDC para notas alcance detalladas
<https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/immunization-schedules/child-adolescent-catch-up.html>

Protocolo de Inmunización de NM: <https://nmhealth.org/publication/view/regulation/531/>

NMSIIS: <https://nmsiis.health.state.nm.us>

Manual de Salud Escolar de NM: <https://www.nmhealth.org/about/phd/pchb/osah/shm/>

Vaxview NM: <https://vaxview.doh.nm.gov/>